

Progesteronprov

Utebliven brunst:

Orsak till provtagning	LÅGT VÄRDE = 0 – 4	HÖGT VÄRDE = 8 och högre
Visar ej brunst	Omprov! Om 7-10 dagar	Är igång.

Svag brunst och oregelbundet brunstintervall:

Orsak till provtagning	LÅGT VÄRDE = 0 – 4	HÖGT VÄRDE = 8 och högre
Brunstig?	Troligen brunstig. Vid cystamisstanke omprov om 7-10 dagar.!	Var ej brunstig när provet togs.

Vid cystamisstanke:

Orsak till provtagning	LÅGT VÄRDE = 0 – 4	HÖGT VÄRDE = 8 och högre
Cysta?	Tyder på aktiv cysta eller brunstig vid provtagningstillfället. Omprov om 7-10 dagar.	Har ej cysta.

Efter cystabehandling:

- ◆ Om kon visar brunst och semineras inom 10 dagar efter behandling tas provet istället 10 dagar efter seminering.

Orsak till provtagning	LÅGT VÄRDE = 0 – 4	HÖGT VÄRDE = 8 och högre
Prov 8-10 dagar efter cystabehandling	Tyder på aktiv cysta eller brunstig vid provtagningstillfället.	Har ej cysta. Seminera på första brunst

Tidig ”ej dräktighetsdiagnos”- visar säkrast att djuret ej är dräktigt

- ◆ Ta progesteronprov dag 19 och även dag 24 efter seminering. En manuell dräktighetsundersökning bör alltid göras efter 7 veckor.

Orsak till provtagning	LÅGT VÄRDE = 0 – 4	HÖGT VÄRDE = 8 och högre
Dräktig? 19 dagar efter ins.	Troligen ej dräktig. Omprov vid dag 24 efter ins.	Kan vara dräktig. Omprov vid dag 24 efter ins.
Dräktig? 24 dagar efter ins.	Troligen ej dräktig.	Preliminärt dräktig om högt värde både dag 19 och 24.

VÄRDE 5 – 7 ÄR ALLTID OSÄKERT = TAG OMPROV!

OMPROV! INNEBÄR ETT NYTT PROV 7-10 DAGAR EFTER PROV 1.

Hur tas provet

- frisk mjölk från en spene
- mjölkprovet tas helst inom 2 timmar efter mjölkning
- fyll i etiketten
- lägg röret märkt med etiketten i kuvertet
- ◆ lägg det på brevlådan

Bilden till höger visar en progesteronkurva hos icke dräktig och dräktig ko

